ÇOK ACELE SÜRELİ

7/55

78

T.C.
TARIM ve KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

SAYI : KDD.S.Ö.1.01/ 1331
KONU : Yazılı soru önergesi.

ANKARA
/06/1999
30 HAZİRAN 1999

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Bşk.lığı Gen.Sek.liği'nin 17.06.1999 Gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-360 Sayılı Yazısı.

İlgi yazı ekinde bakanlığımıza intikal eden ve Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas YILMAZYILDIZ'a ait olan 7/55-286/01298 ve 7/56-287/01299 Sayılı ; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfikar İZOL'a ait olan 7/60-307/01369 Sayılı Yazılı Soru Önergeleri ile ilgili bilgiler, ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

H. Y. Gökalp
Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP
Bakan

EKİ : 12(on iki) adet yazı örneği.

DAĞITIM :
Gereği İçin :
TBMM Bşk.lığı

Bilgi İçin :
Başbakanlık

79

Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas YILMAZYILDIZ'ın 10.06.1999 Tarih ve 7/55-286/01298 Sayılı Yazılı Soru Önergesiyle İlgili Bilgiler :

Soru-1 : Geçen sene embriyo kararması var denilerek çiftçilerimizden ucuza alınan buğdaylar imha edilmiş midir? Edilmemiş ise satılmış mıdır? Satılmış ise kimlere satılmıştır?

Cevap : 1998-Mayıs Ayı'nda meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle özellikle Güney Marmara buğdaylarında yüksek oranlarda embriyo kararması görülmüştür. Daha önce %3'e kadar embriyo kararması olan buğdaylar ekmeklik buğday fiatı ile %3-%5 arasında embriyo kararması olanlar yemlik buğday fiatı ile satın alınmakta iken, %5'in üzerindekiler satın alınmamaktaydı. Ancak çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi bakımından, bu oran Toprak Mahsülleri Ofisi'nce bilahare %10'a çıkarılmış ve 10.07.1998 Tarih'li Resmi Gazete'de yayımlanan kararname uyarınca da %10'a kadar embriyo kararması olanlar ekmeklik buğday fiatı ile ve %10'dan fazla embriyo kararması olanlar da yemlik buğday fiatı ile satın alınmışlardır. %10'a kadar embriyo kararması olan ve ekmeklik buğday fiatı ile satın alınan buğday miktarı 103.863 ton; .%10'dan fazla embriyo kararması olan ve yemlik buğday fiatı ile satın alınan buğday miktarı da 42.530 ton dur.

Anlaşılacağı üzere; ucuza buğday satın alınması söz konusu olmadığı gibi, esasen yemlik buğday fiatı ile satın alınması gereken buğdaylar ekmeklik buğday fiatı ile yani daha yüksek fiat ile satın alınmış ve hiç alınmaması gereken buğdaylar da yemlik buğday fiatı ile satın alınmışlardır.

Satın alınan buğdaylar, ihtiva ettikleri embriyo kararmalı tane oranına göre ayrı ayrı depolarda muhafaza edilmişlerdir. Bunlar önce TMO laboratuvarlarında, bilahare Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve TUBİTAK laboratuvarlarında titiz ve uzun süreli analizlere tabi tutulmuşlardır. Analiz sonuçları dikkate alınarak, insan sağlığı açısından zararlı olmayan, %10'a kadar embriyo kararması ihtiva eden ve ekmeklik buğday fiatı ile satın alınan buğdaylar, yine ekmeklik buğday fiatına satılmışlardır. %10'dan fazla embriyo kararması olan buğdaylardan, ihtiva ettikleri toksin bakımından insan sağlığına zararlı olmayanlar, yemlik buğday fiatına satın alınmışlar ve yine yemlik buğday fiatına satılmışlardır.

İnsan sağlığına zararlı olan buğdayların yakılarak imhası kararlaştırılmış ve imha işlemine başlanılmışken, bunların gıda dışında tuğla ve kontraplak sanayinde kullanılması yolunda bazı talepler gelmiştir. Bunun üzerine imha işlemine ara verilmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla buğdayların bu sanayilerde ne şekilde kullanılabileceği hususunda araştırma ve çalışmalara başlanmıştır. Talep sahibi firmalarla görüşmeler devam etmektedir.

Görüleceği üzere, hem çiftçinin mağduriyetini önlemek hem de insan sağlığı açısından ortaya çıkabilecek sakıncaları bertaraf etmek amacıyla her türlü imkan kullanılarak, gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Soru-2 : Geçen sene büyük zarara uğrayan çiftçilerin zararlarının telafisi ve bu senenin maliyetleri göz önüne alındığında, Türkiye Ziraat Odası Başkanlığı'nca buğday taban fiatının en az 115 bin lira olması istenmektedir.Buğday hasadına başlanmış olup, buğday taban fiatının açıklanması gecikmiştir. Buğday taban fiatı ne zaman açıklanacaktır?

Cevap : 1999-2000 Dönemi hububat destekleme alım fiatları, bakanlığımız tarafından 19.06.1999 Tarihi'nde açıklanmıştır.

Soru-3 : Geçen yıl kullanılan ve süresi bir yıl geçmiş etkisiz ilaçlar nedeniyle buğday üretiminde süne zararlısı ile yapılan mücadele başarısız olmuştur. Bu yıl başta Balıkesir ve Manyas Bandırma, Gönen, Susurluk ilçeleri olmak üzere, Marmara Bölgesi'nde süne zararlısı çok fazla artmıştır. Bu konuda ne gibi tedbirler alınmıştır? Önümüzdeki yıllarda sünenin azaltılması için ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir?

Cevap : Geçen sene de konu ile ilgili gensoru verilmiş ve mücadelede kullanılan ilaçlar, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'ne analiz ettirilmiş ve analiz raporunda ilaçlarda etkisizliğin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Zaten bakanlığımızca, her yıl bir önceki yıldan kalma ilaçların analizi yaptırılmakta ve bu analiz sonuçlarına göre uzmanların verdiği raporlar doğrultusunda, ilaçlar kullanılmaktadır.

1998 Yılı'nda Balıkesir İli'nde 11500 dekar, Çanakkale İli'nde 315750 dekar alanda m2'de 0.8 ve daha fazla kışlamış ergin yoğunluğu tespit edilmiştir. Daha sonra parazitlenmenin yoğun olduğu bu bölgede parazit ve nimf sürveyi yapılarak, Balıkesir İli'nde 9000 dekar, Çanakkale İli'nde 231933 dekar alandaki mücadele eşiğinde nimf bulunmuş ve bu alanlarda ilaçlı mücadele yapılmıştır. Ülke genelinde olduğu gibi bu bölgede de, gerek il müdürleri ve gerekse TMO'ce alınan buğday numunelerinde, ilaçlama yapılan alanlardaki emgi oranları sonuçları, mücadelelerin başarılı olduğu sonucunu vermiştir.

Süne, yurdumuzda hububat ekimi yapılan her yerde bulunmaktadır. Bakanlığımızca zirai mücadele faaliyetleri; zararlı ve hastalık etmenlerine karşı birbirini tamamlayıcı, eko-sistemdeki dengeyi koruyucu, zararlıların yalnız ekonomik zararlarını önleyici şekilde seçilen entegre mücadele yöntemleriyle yapılmaktadır. Böylece mücadelenin homojen olarak yapılması sağlanmaktadır. Hedef en az ilaçla veya ilaç kullanmadan, en uygun zamanda ve çevre ile biyolojik dengeye zarar vermeden, en fazla ürünü hastalık ve zararlılardan korumaktır. Marmara Bölgesi parazitlenmenin yoğun olduğu yerlerdendir. Bu sebeple bu bölgede, mümkün olduğu kadar ilaçlamadan kaçınılmakta, süne mücadelesine sadece o seneyi değil, geleceği de kurtarmak için bakılmakta ve bu doğrultuda mücadele yapılmaktadır.

1999 Yıl'nda da bu şekilde tedbirler alınmış; Balıkesir İli'nde 2036965 dekar, Çanakkale İli'nde 1585000 dekar alanda parazit ve nimf sürveyleri yapılmış ve parazitlenmenin yoğun olduğu yerler, doğal biyolojik mücadeleye terk edilmişlerdir. Bunun dışında Balıkesir İli'nde 553334 dekar, Çanakkale İli'nde 377167 dekar alandaki mücadele eşiğinde nimf tespit edilmiş ve ilaçlı mücadele gerçekleştirilmiştir.Mücadeleler sırasında herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmamıştır.

Önümüzdeki yıllarda da süne mücadelesinde, doğal denge ve çevreye gereken önem verilerek, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve mücadele alanlarının geriye çekilmesi amacıyla elde edilen araştırma sonuçlarının çiftçiye ulaştırılması ve zaman içinde bu mücadelenin çiftçiye mal edilmesi düşünülmektedir.