

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Sayı : B.10.0.TSH.016.00.07//
Konu : Yazılı Soru Önergesi

20223 / 25.06.2008

7/3455

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 23 Mayıs 2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6172 sayılı yazınız.

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN tarafından “Toplumsal Olaylara Müdahalelerde Biber Gazı Kullanılmasına İlişkin” olarak verilen 7/3455 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

EKLER:

EK-1: Önerge Cevabı (1 Sayfa)

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7 / 3455

Sayı : B.10.0.TSH.016.00.07//
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN tarafından "Toplumsal Olaylara Müdahalelerde Biber Gazı Kullanılmasına İlişkin" olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

SORULAR:

1-) Biber gazının insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili herhangi bir bilginiz veya Bakanlığınız bünyesinde yaptığınız bir araştırma var mıdır?

2-) Toplumsal tepkilerini dile getirmek isteyen vatandaşlarımızın sağlıklarını ciddi anlamda tehdit eden biber gazı uygulamasını bir hekim ve Sağlık Bakanı olarak nasıl karşılıyorsunuz?

3-) Ülkemizde biber gazı kullanımıyla ilgili denetleyici ya da engelleyici bir sorumluluk üstlenecek misiniz?

CEVAPLAR: 1, 2, 3.

Biber gazı olarak bilinen kimyasalın temel bileşeni kapsaisindir. Biber gazının içerdiği esas madde "oleum capsicum" yani biber bitkisinden elde edilen doğal bir maddedir. Kimyasal yapı olarak 8-metil-N-vanilin-6-nonenamid olan kapsaisin, pek çok acı biber türünü içeren Capsicum türlerinin ana etken maddesidir.

Biber gazı insanda temas ettiği dokularda özellikle göz ve mukozalarda yanma hissi ve ağrı oluşturan bir maddedir. Gaz ile temas durumundaki ilk belirtiler; burun akıntısı, öksürük, hapşırma, göz yaşarması ve gözde yanma hissidir. Yüksek konsantrasyonlarda maruz kalındığında, göğüste sıkışma hissi, solunum sıkıntısı, ağız ve dilde yanma, tükürük miktarında artış ve kusma görülebilir.

Biber gazına maruz kalan bireylerin çoğunda kısa süre sonra (15-30 dakika) semptomlar geçer. Gözün ovuşturulması durumunda göz ile ilgili yakınmalar daha uzun süre kalabilir. Uzun süreli ve yinelenen maruziyet sonrasında biber gazına karşı alerjik deri reaksiyonu gelişebilir.

Kapasite bozucu ajanlar arasında biber gazı etken maddesinin doğal olması ve insan vücudunda hafif etkilere neden olması nedeniyle uluslararası alanda kargaşa kontrol (Riot Control) ajanı olarak kullanılmakta ve diğer maddelere nazaran tercih edilmektedir.

Biber gazı; Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde yer alan zararlı kimyasal gazlar listesinde bulunmaması, insan sağlığına olan etkilerinin diğer kapasite bozucu ajanlara göre daha az olmasından dolayı dünyada birçok kolluk gücü tarafından kullanılmaktadır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte konu ile ilgili düzenleme bulunmaktadır.

İlginize teşekkür ederim.