



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda yer alan soruların Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR

CHP Adana Milletvekili

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Türk Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Kolu ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından yapılan ortak bir basın açıklamasına göre, İzmir'de kullanım süresi dolmak üzere olan kızamıkçık aşılarının hamile kadınlara uygulanması sonucunda 60 kadın kürtaj olmak zorunda kalmıştır. Ancak aşı olan kadın sayısının çok daha fazla olduğundan şüphe edilmektedir.

SES İzmir Şube Başkanı Dr. Ergun Demir, "Gebe kadınlara, kızamıkçık aşısı yapılmaması ve aşı uygulaması sonrasında 4 haftalık dönemde gebelik planlamaması gerekir. Buna rağmen, 33 ilde bazı gebe kadınlara kızamıkçık aşısı yapıldığı ya da bazı kadınların, aşı yapıldıktan sonraki dört hafta içinde gebe olduğunun anlaşıldığı çok sayıda vaka olduğunu saptadık. Bilimsel verilere göre bu vakaların takip edilmesi gerekli ve acil bir izlem komisyonu oluşturularak vakalarla ilgili karar verilmesi ve ailelerin bilgilendirilmesi gerekli. Ancak ailelere yeterli bilgi verilmemesi ve / veya koordinasyon sağlanamaması sonucu kadınlar panik içinde kürtaj olmuş ve gebelikleri tahliye edilmiştir. Yaptığımız araştırma ve çalışmalara göre, sadece İzmir ilinde aşılanan 18-35 yaş kadınlar arasında gebe iken aşı yapılan ve aşı yapıldıktan sonra gebe kalan kadın sayısı 100 civarındadır. Kürtajla gebelikleri tahliye edilen kadın sayısı 60 civarındadır." Şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Ayrıca yapılan açıklamaya göre ülkemizde Konjenital Kızamıkçık Sendromu olgusuna yönelik sağlıklı bir bilimsel araştırma da yapılmamaktadır. Bu çerçevede;

1. Yukarıda yer alan iddialar doğru mudur? İddiaların araştırılması için herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?

2. Tarihi geçmek üzere olan aşılarda kimlere yapıldığı belirli midir? Bu kişiler tehlike konusunda uyarılmış mıdır? Bu kişilerin sağlık takibi yapılmakta mıdır?

3. Aşı yapılan kadınlar ve hamileler olası riskler hakkında uyarılmış mıdır? Aşı yapıldıktan sonraki 4 hafta içerisinde gerçekleşen hamilelik vakaları takip edilmekte midir?

4. Ülkemizde Konjenital Kızamıkçık Sendromu'nun yaşanma sıklığının araştırılması için nasıl bir çalışma yapılmaktadır?