

7/37070 → 610/110
7/46080 → 610/183

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 20.01.2014 tarih ve 43452547-120.00-160355 sayılı yazınız
b) 26.06.2014 tarih ve 43452547-120.00-184694 sayılı yazınız.

Eskişehir Milletvekili Sn. Ruhsar DEMİREL tarafından verilen “Psikiyatrik hastalar ve tedavi için kullanılan ilaçlara ilişkin” 7/37070 ve 7/46080 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.



Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EK:

7/37070 - 7/46080

Esas Numaralı Yazılı Soru Önergeleri Cevabı (1 sayfa)

Tablo (6 sayfa)

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

SORU 1- Ülkemizde 2005-2013 yılları arasında en çok görülen psikiyatrik hastalıklar hangileridir? Psikiyatrik hastalık teşhisi konan hastaların, yaş ve cinsiyetleri ile illere göre dağılımları nedir?

SORU 2- Ülkemizde 2005-2013 yılları arasında antidepresan ilaç kullanan, yatarak ve ayaktan tedavi edilen hastaların sayıları, yaş ve cinsiyetleri ile hastalık gruplarına göre kullanılan antidepresanların dağılımı nedir?

CEVAP 1, 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan veriler tablo olarak ekte sunulmuştur.

SORU 3- Türkiye'de antidepresan ilaç kullanımındaki artışın nedenleri ile ilgili Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan araştırma var mıdır? Varsa nedir?

CEVAP 3- Rakamlara bakıldığında yıllara göre antidepresan tüketiminin belirli oranlarda arttığı görülmektedir. Antidepresan kullanımının Avrupa'da her yıl ortalama yüzde 20 oranında arttığı görülmüştür. Ülkemizdeki söz konusu artışın da birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bunlar; depresyon tedavisinin uzun süreli ilaç kullanımı gerektirmesi, antidepresanların depresyon dışında da bazı psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılması, depresyonun sık görülen bir rahatsızlık olması nedeniyle birinci basamakta tedavisinin sağlanması konusunda yapılan çalışmalar, sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin artmış olması, her ilde ve çoğu ilçede psikiyatri uzmanı bulunması olarak sıralanabilir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, bu konuda her hangi bir araştırma planlanmamıştır.

SORU 4- Düzensiz antidepresan kullanımı ile bilinçsiz antidepresan tüketiminin toplumdaki intihar olayları ile ilişkisi hakkında Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?

CEVAP 4- Antidepresan ilaçlar birçok kontrollü araştırma ve meta analizler ile etkililiği ispat edilmiş ve buna dayanarak Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış preparatlardır. Uluslararası geçerliliği olan bilimsel çalışmalar, antidepresanların intihara sebebiyet vermesinin söz konusu olmadığını, tam tersine, depresyon tedavisinde önemli derecede etkili olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte bütün diğer ilaçlar gibi doktor kontrolünde, uygun doz ve uygun sürede kullanılmaları da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesinde, sadece antidepresanlar için değil, tüm ilaç grupları için akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 25701053/610

Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

2008	CİNSİYET			Cinsiyet, Yaş ve Yıllara Göre Antidepresan Kullanan Kişi Sayısı
Yaş Grubu	E	K	Kayıt Yok	
0-6	3.499	4.577	60	8.136
7-17	62.457	128.623	86	191.166
18-25	169.570	505.367	5.318	680.255
26-35	457.125	912.876	54.431	1.424.432
36-50	736.126	1.569.646	137.034	2.442.806
51-65	749.819	1.193.170	145.889	2.088.878
65+	440.545	562.110	133.983	1.136.638
Genel Toplam	2.619.141	4.876.369	476.801	7.972.311

2010	CİNSİYET			Cinsiyet, Yaş ve Yıllara Göre Antidepresan Kullanan Kişi Sayısı
Yaş Grubu	E	K	Kayıt Yok	
0-6	4.103	4.205	0	8.308
7-17	95.337	161.753	19	257.109
18-25	178.450	554.756	1.264	734.470
26-35	454.465	1.144.763	13.830	1.613.058
36-50	891.774	2.416.020	46.401	3.354.195
51-65	1.001.676	2.050.853	54.795	3.107.324
65+	622.769	1.094.373	50.440	1.767.582
Genel Toplam	3.248.574	7.426.723	166.749	10.842.046

2011	CİNSİYET			Cinsiyet, Yaş ve Yıllara Göre Antidepresan Kullanan Kişi Sayısı
Yaş Grubu	E	K	Kayıt Yok	
0-6	4.402	4.201	0	8.603
7-17	99.053	165.996	4	265.053
18-25	176.985	539.914	13	716.912
26-35	435.917	1.131.094	0	1.567.011
36-50	795.251	2.301.609	5	3.096.865
51-65	896.542	2.030.145	12	2.926.699
65+	562.666	1.096.651	17	1.659.334
Genel Toplam	2.970.816	7.269.610	51	10.240.477

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

2012	CİNSİYET		Cinsiyet, Yaş ve Yıllara Göre Antidepresan Kullanan Kişi Sayısı
Yaş Grubu	E	K	
0-6	5.392	5.014	10.406
7-17	109.897	186.826	296.723
18-25	237.251	599.866	837.117
26-35	508.163	1.247.397	1.755.560
36-50	880.201	2.494.423	3.374.624
51-65	938.384	2.157.999	3.096.383
65+	633.543	1.291.574	1.925.118
Genel Toplam	3.312.831	7.983.099	11.295.931

2013	CİNSİYET		Cinsiyet, Yaş ve Yıllara Göre Antidepresan Kullanan Kişi Sayısı
Yaş Grubu	E	K	
0-6	5.545	5.091	10.636
7-17	106.549	172.000	278.549
18-25	237.941	555.115	793.056
26-35	476.372	1.143.880	1.620.252
36-50	833.504	2.363.789	3.197.294
51-65	919.753	2.141.429	3.061.182
65+	639.168	1.330.751	1.969.919
Genel Toplam	3.218.832	7.712.055	10.930.888

2014	CİNSİYET		Cinsiyet, Yaş ve Yıllara Göre Antidepresan Kullanan Kişi Sayısı
Yaş Grubu	E	K	
0-6	2.725	2.583	5.308
7-17	72.348	116.214	188.562
18-25	174.079	377.512	551.592
26-35	333.639	786.971	1.120.610
36-50	608.417	1.743.286	2.351.704
51-65	696.464	1.659.753	2.356.217
65+	512.427	1.093.355	1.605.783
Genel Toplam	2.400.099	5.779.674	8.179.776

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

2014 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	42,374%
Toplam F32	Depresif nöbet	22,997%
Toplam F31	Yineleyen depresif bozukluk	4,422%
Diğer		30,207%

2013 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları , toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	42,664%
Toplam F32	Depresif nöbet	24,078%
Toplam F31	Yineleyen depresif bozukluk	4,199%
Diğer		29,059%

2012 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	40,576%
Toplam F32	Depresif nöbet	23,598%
Toplam F33	Yineleyen depresif bozukluk	4,261%
Diğerleri		31,566%

2011 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	40,965%
Toplam F32	Depresif nöbet	23,410%
Toplam F31	Bipolar duygulanım bozukluğu	4,429%
Diğerleri		31,196%

2010 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	42,879%
Toplam F32	Depresif nöbet	22,689%
Toplam F31	Bipolar duygulanım bozukluğu	4,598%
Diğerleri		29,834%

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

2009 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	42,374%
Toplam F32	Depresif nöbet	22,997%
Toplam F31	Yineleyen depresif bozukluk	4,422%
Diğerleri		30,207%

2008 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	40,998%
Toplam F32	Depresif nöbet	24,313%
Toplam F33	Yineleyen depresif bozukluk	5,522%
Diğerleri		29%

2007 YILI

ICD- 10 kodu Ana grup ve alt kırımları toplamı	AÇIKLAMA	Yüzde
Toplam F41	Anksiyete bozuklukları, diğer	37,486%
Toplam F32	Depresif nöbet	26,408%
Toplam F33	Yineleyen depresif bozukluk	6,335%
Diğerleri		29,770%

