



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - THSK TÜTÜN VE  
DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE  
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI - THSK TÜTÜN  
VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE  
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI EVRAK BİRİMİ  
19.08.2014 17:00 - 2014.5784.409 / 610  
00004683371

44141  
GK-162

Sayı : 86696344-610  
Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 26.05.2014 tarihli ve 43452547-120.00-179940 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Ali EDİPOĞLU tarafından verilen “Bonzai adlı uyuşturucu maddenin kullanımının artmasına ilişkin” 7/44141 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU  
Bakan

EK:  
Soru Önergesi Cevabı (2 sayfa)

Hatay Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Ali EDİPOĞLU tarafından verilen “Bonzai adlı uyuşturucu maddenin kullanımının artmasına ilişkin” 7/44141 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

**1- Türkiye’de bonzai ve benzeri uyuşturucuların gençler arasında yaygınlığı konusunda Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Hatay ilinde 2010’dan bu yana bonzai ve esrar gibi uyuşturucuları kullanırken ölen çocuk, genç ve yaşlı sayısı ile bağımlı oranları yıllara göre nasıldır?**

Sentetik kannabinoidler olarak adlandırılan grup içerisinde yer alan maddeler, ülkemizde ilk olarak 2010 yılı ortalarına doğru görülmeye başlanmıştır. Sokak adı ile Bonzai olarak adlandırılan (JWH-018) sentetik kannabinoidin de bulunduğu 19 yeni psikoaktif madde 07/01/2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Bu maddelerden 14 tanesi sentetik kannabinoiddir. Halen toplam 180 psikoaktif madde 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Bu maddelerden 52 tanesinin “sentetik kannabinoid” olduğu bilinmektedir.

Türkiye’de madde bağımlılığı mücadelesi için ulusal yetkili kurum olan TUBİM tarafından 2011’de gerçekleştirilen Genel Nüfus Araştırmasında yer alan yaş gruplarına göre uyuşturucu madde kullanımına ilişkin veriler Tablo 1’de, esrar kullanımına ilişkin veriler Tablo 2’de gösterilmektedir.

Önümüzdeki aylarda yapılacak yeni araştırmalarda yeni bir uyuşturucu türü olan bonzai ve benzeri uyuşturuculara ilişkin sorular da yer alacaktır.

**Tablo1:** Genel Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Yaşam Boyu Uyuşturucu Madde Kullanma Durumlarının Dağılımı, 2011

| Yaş grubu | Yaşam boyu madde kullanımı |         |
|-----------|----------------------------|---------|
|           | Var (%)                    | Yok (%) |
| 15-24     | 2,9                        | 97,1    |
| 25-44     | 2,8                        | 97,2    |
| 45-64     | 2,3                        | 97,7    |

Kaynak: TUBİM Araştırması, 2011

**Tablo 2:** İncelenenlerin Yaşam Boyu, Son 12 Ay, Son 3 Ay, Son 1 Ay ve Araştırmanın Yapıldığı Anda Uyuşturucu Madde Kullanma Prevalansları, 2011.

|            | Esrar kullanma prevalansı (%) | Kişi sayısı |
|------------|-------------------------------|-------------|
| Yaşam boyu | 0,7                           | 56          |
| Son 12 ay  | 0,3                           | 23          |
| Son 1 ay   | 0,2                           | 13          |

Kaynak: TUBİM Araştırması, 2011

Hatay ilinde 2010’dan bu yana bonzai ve esrar gibi uyuşturucuları kullanırken ölen çocuk, genç ve yaşlı sayısı altta gösterilmektedir ve detaylı bilgiler tablonun devamında yer almaktadır.

**Tablo 3:** Hatay İlinde Maddeye Bağlı Ölümlerin Yıllara Göre Dağılımı

| Yıl  | Kişi Sayısı |
|------|-------------|
| 2010 | 5           |
| 2011 | 1           |
| 2012 | 1           |

Kaynak: Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2014

Dolaylı ölümler;

İskenderun; 1 vaka; 15 yaş, erkek, ası ile intihar olup kan örneklerinde eroin, esrar ve ekstazi saptanmıştır.

İskenderun; 1 vaka; 44 yaş, erkek, kesici alet ile yaralanmaya bağlı ölüm, eroin ve esrar saptanmıştır.

Hatay; 1 vaka; 22 yaş, erkek, ateşli silah ile ölüm; eroin ve esrar saptanmıştır

Direk ölümler;

Samandağ; 1 vaka; 26 yaş, erkek, eroin intoksikasyonu

İskenderun; 3 vaka; 26, 28 ve 32 yaş, erkek, eroin intoksikasyonu

**2- Türkiye’de Bonzai kullanan çocuk ve gençlerin sayısı hakkında istatistiki bilgi var mıdır? Bu sentetik uyuşturucuyu kullananların yaş ortalaması kaçtır?**

Türkiye’de Alkol Dışı Madde Kullanıcılarında Tedavi Bildirim Sistemi Formu aracılığıyla toplanan veriler kapsamında 2013 yılında kullanılan esas madde (birincil madde) sentetik kannabinoid olan 405 hasta bulunmaktadır. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 4’de gösterilmektedir. Ayrıca söz konusu olguların yaş ortalaması 24 olup en küçük hastamız 15, en yaşlı hastamız 49 yaşındadır.

**Tablo 4:** Türkiye’de Sentetik Kannabinoid Kullanımının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

| Yaş Grupları | Kişi Sayısı |
|--------------|-------------|
| 15-19        | 113         |
| 20-24        | 107         |
| 25-29        | 101         |
| 30-34        | 50          |
| 35-39        | 27          |
| 40-44        | 5           |
| 45-49        | 2           |

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014

**3- Halkımızı sentetik bonzai uyuşturucusu ve diğer uyuşturucu maddeler hakkında bilinçlendirmek için görsel ve yazılı medyada kamu spotu şeklinde yayım yapmayı düşünüyor musunuz?**

2013-2015 Ulusal Uyuşturucu Eylem planında uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla toplumun farklı kesimlerine (gençlere, ailelere vb) özgün, gerektiğinde kurumlar arası işbirliği ile yazılı, görsel ve işitsel materyal, eğitim modülleri ve programlarının hazırlanması yer almaktadır. Bu konuda yetki ulusal yetkili kurum olan TUBİM’dir.