




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-54045643-610-21273734

Konu : Soru Önergesi (7/29145)

7/29145
GK 176

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13.06.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1643997 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan, Trabzon Milletvekili Sayın Yavuz AYDIN'a ait 7/29145 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/29145) (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 17E76B92-B26A-4F28-94F8-6C075B3F077D

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Levent BOZKURT

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN YAVUZ AYDIN'A AİT 7/29145 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Entegre mücadele prensipleri çerçevesinde ve doğal dengeyi gözetken bir yaklaşımla mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik verilerek mücadele yapılmaktadır. En son seçenek olarak kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.

Yurtdışında yapılmış çalışmalar ve verilen ruhsatlar göz önünde bulundurularak fasulye, kivi, armut, aronya, ayçiçeği, bağ, biber, ceviz, çeltik, çilek, domates, elma, incir, mısır, patlıcan, soya, şeftali, trabzon hurması, turuncgiller ve yaban mersini ürünlerinde geçici ruhsatlar verilmiştir. Ayrıca zararlının bulunduğu her ile feromon tuzaklar gönderilmiş ve bölgedeki tarım ürünlerinin yakınlarına asılarak mücadelesi sağlanmıştır. Üretilen parazitoitler sadece fındık alanlarında değil 35 ilde farklı tarımsal ürünlerin bulunduğu arazilere salınmıştır. Geçici tavsiyelere Bakanlığımıza ait “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı (<https://bku.tarimorman.gov.tr/>)”ndan ulaşılabilir.

Feromon tuzaklar zararlı organizmanın kışlak alanlara giriş ve çıkış dönemlerinde cezbet-öldür yöntemiyle belli noktalara toplanması sağlanarak mekanik veya kimyasal yöntemler kullanılarak yok edilmektedir.

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde, cezbet-öldür ve toplama amacıyla feromon tuzakları Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerine gönderilmiştir. Sonbahar döneminde, kışlama öncesi zararın yoğun görüldüğü Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Bartın illerine toplam 4.150 adet feromon gönderilmiştir.

Biyolojik mücadele kapsamında parazitoit salımları ilk defa 2023 yılında iki ilde yapılmış, ülke genelinde ise ilk defa 2024 yılında uygulanmıştır. Karadeniz Bölgesi’nde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak, Düzce ve Bartın illerinde iklim ve zararlının biyolojisi dikkate alınarak Haziran ve Temmuz aylarında tek seferde salım yapılmıştır. Parazitoitler, illerin sıcaklık ve rakım değerlerine göre kademeli olarak dağıtılmış; yoğunluğun yüksek olduğu Artvin (18.540 adet), Rize (10.024 adet), Trabzon (10.024 adet), Giresun (27.496 adet), Ordu (28.896 adet) ve Samsun (23.408 adet) illerinde daha fazla salım gerçekleştirilmiş, kıyı şeritlerindeki diğer illere ise 5.000’in altında parazitoit salımı yapılmıştır.

Biyolojik mücadelede etkinliğin ölçülmesi için yaklaşık dört yıl salım yapılması gerekmektedir. Klasik biyolojik mücadelenin temel ilkeleri doğrultusunda, yoğun salımların üçüncü yılında etkinlik değerlendirmesi yapılması olağan kabul edilmektedir. 2026 yılı ve sonrasında, biyolojik mücadelenin gerçek etkinliği bilimsel verilere dayanarak ortaya konacaktır.

Samuray arıcığı salım yerleri, feromon tuzakları, arazi ve kışlak kontrolleri sonucu belirlenen zararlı yoğunluklarına göre tespit edilmektedir. Ayrıca tarımsal ürün çeşitliliği ve kimyasal kullanımının az olduğu alanlar tercih edilmektedir. 2025 yılı için kışlak mücadelesi takvimi tüm ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile paylaşılmıştır.

Ülke genelinde Bakanlık onayıyla 9 farklı feromon tipi kullanılmaktadır. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yapılan çalışmalarda, bir sezon boyunca (3 ay) Kostarika menşeli feromon tuzaklarında tuzak başına 1.340 adet, Amerikan menşeli feromonlarda ise 1.435 adet zararlı yakalandığı tespit edilmiştir. Yakalanan zararlıların tuzaklardan çıkarılması büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, 81 ilimizde 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

yatırımları konusunda Kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılacak zirai mücadele alet, makine ve ekipman alımlarına %50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.