

7/37100 GK 59

Sayı : E-54045643-610-23977722

Konu : Soru Önergeleri (7/37100)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.12.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1752370 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan, Burdur Milletvekili Sayın İzzet AKBULUT'a ait 7/37100 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/37100) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 22DED124-5B32-4E69-9757-5200C534C55D

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurdan BUĞDAY

Mühendis

Telefon No:(312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET AKBULUT'A AİT 7/37100 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Söz konusu bölgedeki ağaç kurumaları Burdur Orman İşletme Müdürlüğümüzce tespit edilmiş, yapılan incelemede böcek ve mantar zararlısı tespit edilmemiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen incelemeler neticesinde; bölgedeki karaçam kurumalarının patojen veya beslenme eksikliğinden ziyade, temel olarak iklimsel faktörlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Özellikle 2025 yılında yaşanan şiddetli kuraklık, ekstrem sıcaklık değerleri ve toprak nemindeki dengesizliklerin, zayıf toprak yapısına sahip sahalardaki ağaçlarda fizyolojik strese yol açarak kuruma sürecini tetiklediği sonucuna varılmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu iklim analizleri haritasının incelenmesinden de görüleceği üzere Isparta/Burdur bölgesinin 2025 yılı olağanüstü ve çok şiddetli kurak geçtiği anlaşılmaktadır. Bölgenin 2025 yılındaki yağış miktarında uzun yıllar ortalamasına göre %31, 2024 yılına göre ise %60 azalma gerçekleşmiştir.

Yağış azlığından kaynaklı ağaç kurumaları görüldüğünde kabuk böceği vb. zararlı popülasyonunun artmaması için canlılığını kaybetmiş kuruyan ağaçlar ortamdan kesilerek uzaklaştırılmaktadır.

Söz konusu sahada yaklaşık 1.200 hektarlık alanda münferit ve kısmi alanlar şeklinde ağaçlarda kurumalar görülmektedir.

Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı orman işletme şeflikleri sorumlu oldukları ormanların sağlığını gözlemekte ve her dört ayda bir sağlık durumunu raporlamaktadır. Bu ve benzeri kurumaların emareleri görüldüğü anda ivedi bir şekilde ilgili mevzuatlar gereği zararlıların biyolojisine uygun biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele yapılmaktadır.

Ülkemiz ormanlarında primer ve sekonder zararlıların verdiği ve vereceği tahribatı önlemek adına uygun yerlere feromon tuzakları asılmakta, hastalıklı ağaçlar kesilip orman dışına çıkartılmakta, orman dışına çıkarılması mümkün olmayan yerlerde ise hastalıklı ağaçların kabukları soyularak sekonder zararlılara konukçu olması engellenerek ormanların sağlığı takip ve mücadele edilmektedir.

Özellikli ormanlarda zararlı tespit edilmişse doğaya zarar vermeyen biyolojik mücadeleye ağırlık verilmektedir. Biyolojik mücadele kapsamında zararlı böceklerle beslenen kuşların yuvalanması için ormanlara suni kuş yuvaları yaptırılarak astırılmakta, doğal karınca nakli yapılmakta, zararlı böcek görüldüğünde laboratuvarlarımızda zararlı böceklerle beslenen zararlı böcekleri baskılayan faydalı böcekler üretilerek ormanlara bırakılmak suretiyle doğal dengenin korunmasına çalışılmaktadır.